LES ACCIDENTS PAR EXPOSITION AU SANG (AES) : BILAN DE 4 ANS DE SURVEILLANCE

Rifler JP, Zarouala B, Wamba-Lenga F, Sahli D, Boudenia K, Chaib M

URGENCES
— 2006

Les Rendez-Vous de l'Urgence !

PARIS • PORTE MAILLOT 7, 8 ET 9 JUIN 2006

Définition

- Un accident exposant au sang (AES) est défini comme tout contact avec du sang ou un liquide biologique et comportant soit une effraction cutanée (piqûre ou coupure) soit une projection sur une muqueuse (œil, bouche) ou sur une peau lésée.

Le risque de transmission d'agents infectieux lors d'un AES concerne l'ensemble des germes véhiculés par le sang ou les liquides biologiques (bactéries, virus, parasites et champignons)

En pratique, on redoute surtout le VHB, le VHC et le VIH, en France, du fait de leur prévalence, de l'existence d'une virémie chronique et de la gravité de l'infection engendrée.

Facteurs de risque

- En pratique de soins, il n'y a de risque de contamination par ces virus qu'en cas d'AES, le risque individuel varie en fonction de la gravité de l'AES, et notamment de l'importance de l'inoculum viral. En pratique, les accidents les plus graves sont ceux où :
 - La blessure est profonde
 - La virémie du patient source est élevée
 - L'aiguille est utilisée pour un geste intraveineux ou intra-artériel
 - L'aiguille est visiblement souillée
 - L'aiguille est de gros calibreLes accidents causés par une tierce personne peuvent également être graves car le mouvement de retrait de l'objet vulnérant est moins immédiat.

Méthode

- Matériel protégé mis à disposition des personnels depuis 1999

[Rifler JP](#). Use in the emergency service of short shielded catheters. Ann Fr Anesth Reanim. 1999 Oct;18(8):918-9.

- Registre mis en place en 2002
- Protocole uniformisé pour l'hôpital
- Déclaration, évaluation et traitement aux urgences (disponible 24 h / 24)
- Président du clin et médecin du travail prévenus (suivi assuré par la médecine du travail)
- Evaluation tous les ans (démarche qualité)

Résultats

- 88 AES (2002 - 5)
- Age moyen : 38 ans
- Matériel non sécurisé
- Après le geste +++
- Port des gants : 39 %
- Déclaration : 2 h 30
- Site : doigt (> 85 %)
- 5 traitements anti viraux débutés

Evolution annuelle

+ 21 %

+ 37 %

Discussion

- Le matériel protégé rassure tellement qu'on fait moins attention...
- La sensibilisation marche et maintenant tous les AES sont déclarés...
- Diminution de la gravité des AES : la prescription de ttt antiviraux diminue : 3 en 2002 ; 1 en 2003 ; 1 en 2005 : (efficacité des matériels sécurisés)
- Mais pas d'amélioration du respect des mesures de protection (port de masque, gants, lunettes)
- Mais pas d'amélioration des délais de déclaration : 137,75 min en 2005 vs 139,29 min

ATTENTION

- Aiguille qui traîne ...
- Pas de protection ...
- Pas de container à proximité ...

L'utilisation de matériels sécurisés ne dispense pas de respecter les précautions standards

CONCLUSION

- *Extrait de la circulaire DGS/DH N°98 du 20 avril 98 –*

... "Le chef d'établissement en concertation avec le CLIN, le médecin du Travail et le CHSCT doit définir une stratégie de prévention. Cette stratégie intégrée dans une démarche d'amélioration des conditions de travail doit tenir compte de l'impact des mesures préconisées sur la sécurité des patients et repose sur :

1. la vaccination du personnel soignant
2. le respect des précautions générales d'hygiène
3. l'utilisation rationnelle d'un matériel adapté
4. la prévention de l'exposition dans les blocs opératoires
5. la mise en place d'un dispositif de prise en charge des AES
6. l'interprétation des données de surveillance
7. l'information et la formation du personnel
8. l'évaluation des actions entreprises" ...